

術前中止薬一覧(50音順)

	薬品名	休業期間	分類	成分名
あ	アスピリン腸溶錠	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	アスピリン原末	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ア	アスファネート配合錠A81	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	アンジュ21錠・28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール
い	アンブラーク錠50・100/細粒	1-2日間	抗血小板作用薬	サルボグレート
	イグザレルト錠2.5・10・15/OD錠10・15	1日間	抗凝固薬(DOAC)	リバーロキサパン
い	イグザレルト細粒10・15/ドクシシロップ小児用103.4・51.7	1日間	抗凝固薬(DOAC)	リバーロキサパン
	イコサヘン酸エチルカプセル300/粒状カプセル300・600・900	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
い	イコサヘン酸エチル顆粒カプセル600・900	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
	インジビロ配合錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	アログリチン・ネホルミン
い	イファンゾール錠10・20	2日間	抗血小板作用薬	イファンゾール
	ウエルナラ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(閉経後骨粗鬆症治療剤)	エストラジオール・レボノルゲストレル
う	ウトゲス錠服用カプセル200	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	プロゲステロン
	エカット配合錠LD・HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ビルダグリチン・ネホルミン
え	エストラナーブ0.09・0.18・0.36・0.72	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストラジオール
	エストライカプセル156.7	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(前立腺癌治療剤)	エストラムスタンジオールエステルナトリウム水和物
え	エストリール錠100γ・0.5・1/錠錠0.5	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害・腫瘍治療剤)	エストリオール
	エストリール錠1	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストリオール
え	エパテルカプセル300/S300・600・900/EM2	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
	エパロカプセル300/粒状カプセル300・600・900	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
え	エビスタ錠60	2日間	SERM	ラロキシファン
	エイメン錠2.5・3.75・5・20	14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	ブラスクレ
え	エイヌカプセル100	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	プロゲステロン
	エリキウス錠2.5・5	1-2日間	抗凝固薬(DOAC)	アピキサパン
お	オサケル錠100・200	当日	抗血小板作用薬	オサケル
	オハルモン錠5	1日間	抗血小板作用薬	リマロストナフテクス
か	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA・DHA製剤(オメガ-3脂肪酸エチル)
	カナグル錠100	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	カナグリロジン
か	カナリア配合錠	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	カナグリロジン・ネナグリグリチン
	キャプビリン配合錠	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン・ホフブラスン
か	クニコラン錠250	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ネホルミン
	ククロドグレル錠25・50・75	14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	ククロドグレル
か	ケアロードLA錠60	2-3日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
	ケタスカプセル10	3日間	抗血小板作用薬	イファンゾール
こ	コリアアユウ錠50・100	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	シラゼブ
	コンプラビン配合錠	14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	ククロドグレル・アスピリン
さ	サアミオン錠5/散	2日間	抗血小板作用薬	ニセルグリル
	サルボグレート錠50・100	1-2日間	抗血小板作用薬	サルボグレート
さ	シメナ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレル
	ジビタモール錠12.5・25・100/散	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビタモール
さ	シハス錠50	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ブホルミン
	シラゼブ錠50・100	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	シラゼブ
さ	シヤディアンス錠10・25	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	エンバケリフロジン
	ジュリナ錠0.5	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストラジオール
さ	シロスタゾール錠50・100/OD錠50・100	3日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
	シロスタゾール内服ゼリー50・100	3日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
さ	シニューズT28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	メルエチステロン・エチルエストラジオール
	スーグラ錠25・50	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	イブラグリフロジン
さ	スーニャ配合錠	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	イブラグリフロジン・シタグリグリチン
	セロケール錠10・20	2日間	抗血小板作用薬	イファンゾール
た	タケルタ配合錠	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン・ランソプラゾール
	チクロピジン錠100/細粒	10-14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	チクロピジン
た	ティビケル1	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストラジオール
	チヘルザ錠20	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	トホグリフロジン
た	トコフェール酢酸エステル錠50・100/カプセル100/顆粒	2日間	ビタミンE	トコフェール酢酸エステル
	トコフェールニコチン酸エステルカプセル100・200	2日間	ビタミンE	トコフェールニコチン酸エステル
た	トメナ錠100・200	当日	抗血小板作用薬	オサケル
	トリアディアンス配合錠AP・BP	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	エンバケリフロジン・リナグリグリチン
た	トレゾル錠50・100	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	トレゾル
	トリキユラ錠21・錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール
た	トルナー錠20	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
	トロエチ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(更年期障害治療剤)	ドクロヒレン・エチルエストラジオール

	薬品名	休業期間	分類	成分名
な	ニコ200ソフトカプセル	2日間	ビタミンE	トコフェールニコチン酸エステル
	ニセルグリル錠5/細粒	2日間	抗血小板作用薬	ニセルグリル
な	ニキス配合錠A81	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	ハイアステリ錠100	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
な	バステルF錠3	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	リナグリグリチン
	バゼドキシファン錠20	2日間	SERM	バゼドキシファン酢酸塩
な	バサミン配合錠A81	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	パナジール錠100/細粒	10-14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	チクロピジン
な	パファリン配合錠A81	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	ヒスロ錠5/H錠200	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	ドクロヒレン・酢酸エステル
な	ピビアント錠20	2日間	SERM	バゼドキシファン酢酸塩
	ファマール錠21・錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デナゲストレル・エチルエストラジオール
な	ファモター配合錠A81	7-10日間	抗血小板作用薬	アスピリン
	オシガ錠5・10	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	グバグリフロジン
な	フォルミン塩酸塩塩糖溶解50	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ブホルミン
	ラサキサカプセル75・110	【CCr _{Cr} ≥50mL/min】24時間 【30≤CCr<50mL/min】48時間	抗凝固薬(DOAC)	ダビカトランエチキシアートメタン
な	ララバル配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(中用量ピル)	ククロドグレル・エチルエストラジオール
	プレックス錠25・75	14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	ククロドグレル
な	プレウル配合錠LD・ULD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	メルエチステロン・エチルエストラジオール
	プリリタ錠60・90	5日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	チカグレル
な	プレミン錠50・100/OD錠50・100/散	3日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
	プレマリン錠0.625	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害・腫瘍治療剤)	結合型エストロゲン
な	プロザイン錠20	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
	プロセキール錠0.5	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(末期乳癌・前立腺癌治療剤)	エチルエストラジオール
な	プロヘラ錠2.5	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	ドクロヒレン・酢酸エステル
	プロナール錠5	1日間	抗血小板作用薬	リマロストアルフテクス
な	ペラサシLA錠60	2-3日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
	ペラロストナトリウム錠20・40	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
な	ペラロストNa錠20・40	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロストナトリウム
	ベルサン錠12.5・25・100	1-2日間	抗血小板作用薬	ジリタモール
な	ホーン錠1/錠服用錠1	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害・腫瘍治療剤)	エストリオール
	ホーン錠100・200	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	子宮内服症治療薬	ダナゾール
ま	マーベロ21・28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	デナゲストレル・エチルエストラジオール
	メタロ配合錠LD・HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ビオグリグリチン・ネホルミン
ま	メトナ配合錠LD・HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	アナグリグリチン・ネホルミン
	メトグル錠250・500	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ネホルミン
ま	メトホルミン錠250・500/250MT・500MT	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ヒグアナイド剤)	ネホルミン
	メトキシロブステロン酢酸エステル錠2.5・5・200	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	ドクロヒレン・酢酸エステル
ま	メイトコンビパッチ	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストラジオール・酢酸エステル
	マース配合錠・マースフレックス配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(更年期障害治療剤)	ドクロヒレン・エチルエストラジオール
ま	ユアラ錠50	2日間	ビタミンE	トコフェール酢酸エステル
	ユアラソフトカプセル100/Nソフトカプセル200	2日間	ビタミンE	トコフェールニコチン酸エステル
ま	ラベラフルーニ21錠・28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ピル(経口避妊剤)	メルノルゲストレル・エチルエストラジオール
	ラキクシファン錠60	2日間	SERM	ラキクシファン
ま	リクシナ錠15・30・60/OD錠15・30・60	1日間	抗凝固薬(DOAC)	エトキサバントシル酸塩水和物
	ルマロストアルフテクス錠5	1日間	抗血小板作用薬	リマロストアルフテクス
ま	ル・エストロジェン	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣ホルモン(更年期障害治療剤)	エストラジオール
	ルセフ錠2.5・5/ODフィルム2.5	3日間	経口血糖降下薬(SGLT2阻害剤)	ルセオグリフロジン
ま	ルネイタ錠100	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	プロゲステロン
	ルネラム錠服用剤400	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	プロゲステロン
ま	ルネラム配合錠LD・ULD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	卵巣・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	メルエチステロン・エチルエストラジオール
	ロルナル錠50・100/細粒	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	ロルナル
ま	ロリカ粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA・DHA製剤(オメガ-3脂肪酸エチル)
	ロレア配合錠	14日間	抗血小板作用薬(P2Y ₁₂ 阻害剤)	ククロドグレル・アスピリン
ま	ワラフリカ錠0.5・1・5/顆粒	5日間(緊急時VK、第Ⅱ因子複合体)	抗凝固薬	ワラフリカカウム
	ワラフリカ錠0.5・1・2/細粒	5日間(緊急時VK、第Ⅱ因子複合体)	抗凝固薬	ワラフリカカウム
ま	ワラングン錠服用ゲル90	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	黄体ホルモン	プロゲステロン

*赤地はBG系DM薬・青地はSGLT2-IDM薬

※術日を0日目とします。 医療法人 倚山会 岡岡病院薬科科

2023年1月改定